

丸石製薬の麻酔科製剤ラインナップ

全身吸入麻酔剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

セボフレン[®]吸入麻酔液

SEVOFRANE[®] [日本薬局方：セボフルラン]

セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」

SEVOFLURANE [日本薬局方：セボフルラン]

短時間作用型 β_1 遮断剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

ブレビブロック[®]注 100mg

BREVIBLOC[®] inj. 100mg [一般名：エスモロール塩酸塩]

長時間作用性局所麻酔剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

ポプスカイン[®] 0.25%注

(25mg/10mL・シリンジ25mg/10mL・バッグ250mg/100mL)

POPSCAINE[®] 0.25% inj. [一般名：レボブピバカイン塩酸塩]

ポプスカイン[®] 0.5%注

(50mg/10mL・シリンジ50mg/10mL)

POPSCAINE[®] 0.5% inj. [一般名：レボブピバカイン塩酸塩]

ポプスカイン[®] 0.75%注

(75mg/10mL・150mg/20mL・シリンジ75mg/10mL)

POPSCAINE[®] 0.75% inj. [一般名：レボブピバカイン塩酸塩]

局所麻酔剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

日本薬局方

リドカイン注射液 (0.5%, 1%, 2%)

LIDOCAINE INJECTION [一般名：リドカイン]

局所麻酔剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

**塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」
(0.5%, 1%, 2%)**

MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION SYRINGE

[日本薬局方：メピバカイン塩酸塩注射液]

全身麻酔・鎮静剤

劇薬、習慣性医薬品^{注2)}、処方箋医薬品^{注1)}

プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」

プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」

プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」

Propofol Intravenous Injection 1% "Maruishi"

プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」

Propofol Intravenous Injection 2% "Maruishi"

α_2 作動性鎮静剤

劇薬、習慣性医薬品^{注2)}、処方箋医薬品^{注1)}

プレセデックス[®] 静注液200 μ g「マルイシ」

静注液200 μ g/50mLシリンジ「マルイシ」

Precedex[®] [一般名：デクスメトミジン塩酸塩]

血圧降下剤

毒薬、処方箋医薬品^{注1)}

ニトプロ[®] 持続静注液 (6mg, 30mg)

← NITOPRO[®] CONTINUOUS INTRAVENOUS SOLUTION

[一般名：ニトロプルシドナトリウム水和物]

非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

毒薬、処方箋医薬品^{注1)}

**ロクロニウム臭化物静注液^{25mg/2.5mL}「マルイシ」
^{50mg/5.0mL}**

Rocuronium Bromide Intravenous Solution

[一般名：ロクロニウム臭化物]

催眠鎮静剤

向精神薬、習慣性医薬品^{注2)}、処方箋医薬品^{注1)}

ドルミカム[®] 注射液 10mg

Dormicum[®] Injection 10mg [一般名：ミダゾラム]

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

劇薬、処方箋医薬品^{注1)}

フルマゼニル注射液0.5mg「F」

FLUMAZENIL Injection [一般名：フルマゼニル]

注1) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

注2) 注意 - 習慣性あり

薬価基準収載

* 効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等詳細は添付文書をご参照ください。

製造販売元

丸石製薬株式会社

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2

【資料請求先】

丸石製薬株式会社 学術情報部

TEL.0120-014-561

2020年2月作成